

DUTLARDA DON ZARARI SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

- Don olayı gerekleřtikten birkaç gn sonra gzler ve srgnler kontrol edilmeli srgn ve gzlerde kahverengi siyah grnt ve akıntılar don zararı olarak kaydedilmeli ve hasar tahmini yapılmalıdır.
- Zarar grmř ve kurumuř dallar budanmalı ve aēatan uzaklařtırılmalıdır.
- Zararlanma sonrası rehabilitasyonu artırabilmek iin yapraklanmadan sonra dřk dozda azot uygulanmalıdır.
- Kesilen yzeylerden hastalık giriřini engellemek iin dřk dozda bakırlı ilalama yapılmalıdır.
- Bitki geliřim dzenleyicileri kullanılmalıdır.
- Gbreleme programında fosfor, potasyum, azot bir miktar artırılmalı ve kk sistemini geliřtirmek iin organik maddesi yksek mikrobiyal gbreler kullanılmalıdır.
- Dzenli ve yeterli sulama yapılmalıdır.



ERZİNCAN BAHE KLTRLERİ ARAřTIRMA
ENSTİTS MDRLē

Tel : 0 (446) 225 19 03

Faks : 0 (446) 225 2052

<http://arastirma.tarimorman.gov.tr/erzincanbk>

© 2025 TAGEM

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIēI



Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel
Mdrlē

Erzincan Bahe Kltrleri Arařtırma
Enstits Mdrlē

DUT YETİřTİRİCİLİēİNDE DON ZARARI SONRASI YAPILMASI GEREKEN İřLEMLER

ERZİNCAN

2025

DON ZARARI

- Don zararları, meyve ağaçlarında özellikle çiçeklenme ve küçük meyve döneminde önemli kayıplara yol açar. Hasarın boyutu; don süresi, sıcaklık düzeyi ve fenolojik evreye göre değişir.
- Don zararının boyutu meyve türünden, tür içerisindeki çeşide göre ve ağacın genel sağlık ve çiçeklenme durumuna göre değişeceğinden, don zararından sonraki müdahale meyve türüne ve ağaçların çiçeklenme ve genel sağlık durumu ile hasar oranına göre değişiklik göstereceğini unutmamak gerekir



DUT TÜRLERİNİN DONA HASSASİYET DÖNEMLERİ

- Dut ağaçları genellikle son dönem tomurcuk patlatıp erken çiçeklenen ve erken meyve olgunlaştıran bir meyvedir. Ancak tomurcukların patlamaması ile birlikte soğuğa karşı hassasiyet de artmaktadır. Ayrıca kara dut (*Morus nigra* L.) türünün gözleri ve sürgünleri beyaz dut (*M. alba* L.) türünün göz ve sürgünlerinden daha

hassastır. Bahçe kurulumunda yer ve yöney seçimi ile yetiştirilecek olan türün seçimine de dikkat edilmelidir.

- Bahçe kurulacak alanın kış soğuk durumu, ilkbahar geç don durumu ile güney rüzgarlarına olan durumu da göz önünde bulundurulmalı, ciddi bir araştırma yaparak karar vermeli, soğuğun şiddetli olacağı düşünülen alanlara beyaz dut türleri düşünülmelidir. **Yer ve yöney seçimi ile birlikte tür seçimi**, ağaçların kondisyonun yüksek tutulması, sağlıklı olmaları fidan ve ağaç kayıplarını önleyerek, ekonomik kayıplarının giderilmesine katkı yapacaktır. Rüzgar makineleri, hava karıştırıcıları, sisleme makineleri kullanmak ve dumanlama yapmak da don zararına karşı alınabilecek tedbirlerdendir.
- Zirai don zararından dolayı stres altında kalan ağaçlar mikro element içeren (kalsiyum, çinko, demir ve mangan gibi) yaprak gübreleri ve uygun dozda azotlu gübreler ile desteklenmelidir.