



T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bartın İl Müdürlüğü



KAPYA BİBER
YETİŞTİRİCİLİĞİ

TOPRAK HAZIRLIĞI

Tarlada fidelerin yerlerine dikilmesi için toprağın 20-30 cm derinlikte iyice işlenmesi ve ufalanması gerekmektedir. Biberlerde düz alana dikimden ziyade sırta dikim yapılmalıdır.



FİDE DİKİMİ

Sürüm yapıldıktan sonra tahta ve masuralar yapılır. Tahtalar 80-120 cm, masuralar 40-60 cm genişlikte olur. Tahtalara 2-4 sıra, masuralara ise tek veya çift sıra dikim yapılır. Fideler sıra arası 60-80 cm, sıra üzeri 50-60 cm olarak dikilir.



ÇAPALAMA

Çapalama ile yabancı ot gelişimi engellenerek toprağın havalandırılması sağlanır. Bitkiler 15-20 cm boy aldığında mutlaka çapalama yapılmalıdır.



KAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

SULAMA

Suyun düzenli ve belirli aralıklarda verilmesi gerekmektedir. İlk çiçeklenme başladığı dönemlerde bitkiler kuraklığa oldukça duyarlıdır. Bu sebeple bu dönemde sık aralıklarla hafif sulamalar yapılabilir. Sıcak havalarda, kumlu topraklarda her 2-3 günde bir, ağır topraklarda 3-7 günde bir sulama yapılmalıdır .



GÜBRELEME

İyi bir gübreleme yapmak için toprak tahlili yapmak birinci önceliklidir. Tahlil sonucuna göre bulunan değerler ve verilen çiftlik gübresindeki bitki emrine giren miktar toplanarak, toplam gübre ihtiyacından çıkarılmalı ve kalan kısım kimyevi gübrelerle karşılanmalıdır. Ayrıca dekara 3-5 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Azotlu ve potasyumlu gübreler çiçeklenme döneminden itibaren 3-4 taksitte verilmelidir.



HASAT

Haziran sonu temmuz ayı başlarında hasada başlanıp genelde ekim ayı ortalarında hasat son bulur. Toplam 9-15 defa hasat yapılır. Biber, uygun büyüklüğü aldığında hasat edilmelidir.



GÖRÜLEBİLİCEK HASTALIKLAR

Biber kök boğazı yanıklığı, mildiyö, alternaria, antraknoz, gövde yanıklığı, külleme, kurşuni küf, beyaz çürüklük, meyve çürüklüğü.



ZARARLILAR

Nematod, bozkurt, danaburnu, tel kurdu, biber kurdu, biber gal sineği, yeşilkurt, yaprak bitleri, yaprak galeri sineği, kırmızı örümcek, yaprak piresi, sarı çay akarı, thrips, pamuk çizgili yaprak kurdu.



NOT

Hastalık ve zararlılarla mücadelede daha geniş bilgi için **İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.**

Dünyada üretilen biberin yaklaşık %23'ü Çin de, %10'u Türkiye'de üretilmektedir. Türkiye de yılda üretilen biberin %8'ini kaypa teşkil eder. Biber düşük kalorili olup A ve C vitaminlerince zengindir. Biberler konserve, salça, turşu, sos, boya sanayinde, ilaç sanayinde vb. gibi çeşitli alanlarda kullanılır.



İKLİM İSTEKLERİ: Optimal gelişme sıcaklığı 18-26 °C'dir. Biber erken devrelerde daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. Toprak neminin fazla, besin maddelerince yeterli ve hava sıcaklığının 24-26 °C olduğu zamanlar iyi gelişim gösterir. Biber yetiştiriciliğinde optimum hava oransal nemi % 60-70'dir.

TOPRAK İSTEKLERİ: Organik maddece zengin, çeşitli besin maddelerini içeren, tınlı, tınlı-kumlu, su tutma kapasitesi iyi, çabuk ısınabilir, derin, geçirgen, iyi drene edilmiş topraklar biber için

SU İSTEKLERİ: Suyu çok seven bir bitkidir. Optimum toprak nemi tarla kapasitesinin % 70-80 civarında, hava oransal neminin % 60-70 civarında olması istenir. Nemli şartlarda kök aktivitesi artar.



BARTIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon : 0378 227 02 23 - Faks : 0378 227 12 52

